

مقایسه ماده آلی خاک در تیپ‌های خالص و آمیخته بلوط در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل‌های آرمرده بانه)

سامان ملکی^۱، بابک پیلهور^۲ و محمدعلی محمودی^{۳*}

- ۱- دانش‌آموخته دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.
 - ۲- استاد گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.
 - ۳- استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. (نویسنده مسؤل: a.mahmoodi@uok.ac.ir)
- تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۴/۲ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ صفحه: تا

چکیده مبسوط

مقدمه و هدف: گردآمدن درختان به عنوان اصلی‌ترین اجزای اکوسیستم جنگل‌ها دارای پراکنش فضایی خاصی بوده و مشخصه‌های رویشگاهی و محیطی نقش بسزایی را در این پراکنش دارند. گونه‌های درختی با تشکیل تیپ‌های جنگلی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ویژگی‌های خاک از طریق تولید لاشبرگ بوده و نقش اساسی در کمیت و کیفیت ماده آلی خاک و آزادسازی عناصر غذایی خاک دارند. پژوهش حاضر به بررسی کربن آلی و نیتروژن خاک با روش‌های استخراج با آب گرم و سرد به عنوان شاخصی از تغییرات ماده آلی خاک در دو تیپ مازودار خالص و آمیخته ویول-مازودار در زاگرس شمالی (جنگل‌های آرمرده بانه) می‌پردازد.

مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر ویژگی‌های جنگل‌شناسی با ۵ قطعه نمونه ۴۰۰ مترمربعی تصادفی در هر تیپ اندازه‌گیری شد. همچنین خاک زیراشکوب تیپ‌های مورد مطالعه با استفاده از ۱۰ نمونه ترکیبی از عمق ۱۰-۱۰۰ سانتی‌متری (پس از کنار زدن لایه لاشبرگ) برداشت شد. پس از اندازه‌گیری متغیرهای مورد مطالعه، مقایسه آماری متغیرها در تیپ‌های جنگلی با استفاده از آزمون t مستقل و همبستگی آنها با ضریب همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت. **یافته‌ها:** نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین میزان کربن آلی خاک و نیتروژن کل خاک بین تیپ‌های مازودار خالص و ویول-مازودار مشاهده نشد. هر چند که مقادیر کربن آلی و نیتروژن قابل استخراج با آب گرم و سرد، زی‌توده میکروبی کربن و نیتروژن در تیپ ویول-مازودار بیشتر بود؛ اما این تفاوت به غیر از کربن آلی قابل استخراج با آب سرد معنی‌دار نشد. بین کربن قابل استخراج با آب گرم با زی‌توده میکروبی کربن و کربن قابل استخراج با آب سرد همبستگی معنی‌داری وجود داشت. همچنین بین نیتروژن قابل استخراج با آب گرم با زی‌توده میکروبی نیتروژن و کربن همبستگی معنی‌دار مشاهده شد. در نهایت همبستگی معنی‌داری بین نیتروژن خاک با زی‌توده میکروبی و نیتروژن قابل استخراج با آب سرد وجود داشت، اما ضریب همبستگی کمتر از همبستگی کربن آلی خاک با زی‌توده میکروبی کربن و کربن قابل استخراج با آب سرد بود.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مواد آلی قابل استخراج با آب گرم را می‌توان به عنوان یک شاخص حساس از تغییرات کیفیت ماده آلی در خاک‌های جنگلی استفاده کرد.

کلمات کلیدی: زی‌توده میکروبی، کربن آلی قابل استخراج با آب گرم، ویژگی‌های خاک، همبستگی پیرسون

مقدمه

پهن‌تر و با حاشیه کنگره‌دار دارای میوه‌های تقریباً استوانه‌ای و کشیده می‌باشد. تنه دارای شکاف‌های عرضی نامنظم است و نیاز اکولوژیکی آن کمتر از ویول می‌باشد (Naderi shahab, 2016). ماده آلی (Soil organic matter) یکی از بخش‌های مهم خاک است که شامل بقایای بافتی گیاهان و جانوران، اجزا تجزیه نشده تا جزئی تجزیه شده آنان و ریزجانداران مرده می‌باشد (Edwards & Arancon, 2022). وجود ماده آلی علاوه بر اینکه نشان‌دهنده حاصلخیزی و کیفیت خاک است (Kooch et al., 2022)، شاخص مناسبی برای باروری خاک به شمار می‌رود که حاصل برهمکنش فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی است. ماده آلی با بهبود شرایط خاکدانه-سازی، وضعیت تخلخل و نفوذپذیری خاک را بهبود می‌بخشد؛ بنابراین نقش مهمی در پایداری اکوسیستم داشته و به همین دلیل بررسی جنبه‌های مختلف آن یکی از ضرورت‌ها و پایه‌های اصلی در مطالعات کیفیت خاک، چرخه کربن و تغییرات اقلیم است (Yang et al., 2023). مقدار کربن ناپایدار خاک به عنوان یک شاخص حساس به تغییرات ماده آلی خاک شناخته شده است و از روش‌های استخراج با آب سرد و گرم برای تعیین ماده آلی ناپایدار خاک‌ها استفاده می‌شود (Jiang et al., 2023). روش استخراج با آب سرد (Cold water extraction) در اواخر دهه ۱۹۸۰ برای تخمین معدنی شدن ماده آلی خاک

گردآمدن درختان به عنوان اصلی‌ترین اجزای اکوسیستم جنگل‌ها دارای پراکنش فضایی خاصی بوده و مشخصه‌های رویشگاهی و محیطی نقش بسزایی را در این پراکنش دارند. تیپ جنگلی معمولاً با یک نمای مشخصی از رستنی‌های موجود به نوع خاصی از جنگل اطلاق می‌شود و با ساختار جمعیتی و الگوهای فراوانی و پراکنش گیاهان که مفهوم آن با آمیختگی و ترکیب گونه‌ها قرین است، تعریف می‌شود و به عنوان شاخصی برای مقایسه وضعیت اکولوژیک اکوسیستم جنگلی به کار گرفته می‌شود (Badehian et al., 2021). این تیپ‌ها در یک منطقه در فرم‌های خالص و آمیخته در مطالعات مختلف دسته‌بندی می‌شوند. جنگل‌های زاگرس خاستگاه چهار گونه‌ی بلوط هستند که زاگرس شمالی بیشتر گونه‌های مازودار (*Quercus infectoria* Olive.) و ویول (*Quercus libani*)، و روبر (*Quercus robur* L.) (در مقیاس کم و تنها در حوالی میرآباد، تکه‌هایی در کردستان و اسکو) را در خود جای داده است. درختان ویول و مازودار از لحاظ ویژگی‌های ریخت-شناسی و استقرار در محیط تفاوت‌های خاصی با یکدیگر دارند. به این صورت که برگ در ویول باریک و نیزه‌ای با قاعده صاف، میوه درشت و پوست تنه صاف می‌باشد و اکثراً دامنه‌های شمالی با خاک‌های با رطوبت زیاد را می‌پسندد. در مقابل برگ مازودار

در علفزارها و خاک‌های جنگلی استفاده شد (Corre *et al.*, 1999). روش استخراج با آب گرم (Hot water extraction) نیز توسط برونر و باچلر در سال ۱۹۷۹ برای تخمین معدنی شدن نیتروژن در کشت چغندرقد در اتریش معرفی شد (Bronner & Bachler, 1979). مواد استخراج شده با آب گرم حاوی زی‌توده میکروبی، کربوهیدرات‌های محلول و سایر ترکیبات ساده می‌باشد (Gagnon & Ziadi, 2022). از جمله عوامل متعددی که تغییرات ماده آلی خاک را در کنترل می‌کنند، پوشش گیاهی و بقایای ناشی از آن است که به عنوان منبع اصلی ماده آلی خاک نقش مستقیمی در ترکیب و تحولات آن دارند (Bayranvand *et al.*, 2021). تغییر پوشش گیاهی ممکن است دانه‌های خاک را تغییر دهد و متعاقباً بر ترکیب شیمیایی کربن آلی خاک تأثیرگذار باشد؛ همچنین بر مقدار فلزها و کربوکسیل‌های مشتق شده از لیگنین تأثیر می‌گذارد. تغییرات در ترکیب شیمیایی ماده آلی خاک مرتبط با تغییر پوشش گیاهی ممکن است به الگوهای مختلف معدنی شدن و ورودی‌های کربوهیدرات مشتق شده از گیاه نسبت داده شود (Guo *et al.*, 2016). لندگراف و همکاران در مطالعه‌ای بر روی ماده آلی قابل استخراج با آب سرد و گرم به عنوان شاخص‌های تجزیه لاشبرگ در خاک‌های جنگلی به این نتیجه رسیدند که سلول‌های رویشی میکروارگانیسم‌ها در استخراج با آب گرم (۷۰ درجه سانتی‌گراد) از بین رفته و بسیاری از اجزای زی‌توده میکروبی و همچنین بسیاری از مواد آلی غیر میکروبی استخراج می‌شوند و نسبت به استخراج با آب سرد دارای نرخ تجزیه‌پذیری بسیار بالاتری است (Landgraf *et al.*, 2006). چوداک و همکاران طی پژوهشی بیان داشتند که کربن آلی و نیتروژن کل قابل استخراج با آب گرم در خاک‌های جنگلی راش (*Fagus sylvatica*) هیچ اندازه‌گیری بهتری از کربن موجود برای میکروارگانیسم‌های خاک نسبت به کربن آلی و نیتروژن ارائه نمی‌کند، اگرچه مقدار کربن آلی قابل استخراج با آب گرم ارتباط معنی‌داری با زی‌توده میکروبی کربن و نسبت کربن آلی خاک به کل نیتروژن داشت (Chodak *et al.*, 2003). همچنین چن و سوو دریافتند که کربن آلی و نیتروژن کل قابل استخراج با آب گرم با کربن آلی کل و نیتروژن نسبت به زی-توده میکروبی کربن و نیتروژن همبستگی بیشتری دارد (Chen & Xu, 2005).

از آنجایی که اطلاعات بسیار کمی درباره ماده آلی قابل استخراج با آب گرم به عنوان یک شاخص کیفی از ماده آلی خاک در جنگل‌ها وجود دارد و لزوم توجه به شناخت بهتر اثر پوشش‌های گیاهی مختلف بر خاک موجب پیش‌بینی دقیق‌تر اثر گونه‌ها بر بوم‌سازگان و مدیریت بهینه آنها برای مدیران و جنگل‌شناسان می‌شود. لذا با توجه ویژگی‌های منحصر به فرد مطالعات میکرومرفولوژیک و توجه کم به آن جهت بررسی ماده آلی خاک، در کنار گزارش کمی ویژگی‌های جنگل‌شناسی و خاک منطقه مورد مطالعه این تحقیق در تلاش برای روشن‌تر شدن جنبه‌های جدیدی از تحولات ماده آلی خاک که توسط روش‌های معمول بیوشیمیایی کشف نشده است و در جنگل‌های زاگرس شمالی در آرمرده بانه با توجه به حضور سه گونه‌ی مختلف بلوط که در سطح منطقه تیپ‌های متفاوتی را تشکیل

داده‌اند آزمایشات بر روی دو تیپ انتخابی انجام شد. سطح این مطالعه با توجه به تمرکز بر تیپ‌های جنگلی که در منطقه دارای ویژگی‌های زمین‌شناسی و اقلیمی تقریباً برابر می‌باشند تعریف شد. از آنجایی که اطلاعات بسیار کمی درباره ماده آلی قابل استخراج با آب گرم به عنوان یک شاخص کیفی از ماده آلی خاک در جنگل‌ها وجود دارد و لزوم توجه به شناخت بهتر اثر پوشش‌های گیاهی مختلف بر خاک موجب پیش‌بینی دقیق‌تر اثر گونه‌ها بر بوم‌سازگان و مدیریت بهینه آنها برای مدیران و جنگل‌شناسان می‌شود.

بر اساس نقش‌های مهم ماده آلی خاک در این مطالعه و بررسی مطالعات قبلی در مورد کیفیت ماده آلی خاک، فرضیات ما به این صورت تعریف شدند: (۱) تغییر تیپ‌های جنگلی بر کمیت و کیفیت ماده آلی خاک تأثیر می‌گذارد. (۲) ماده آلی قابل استخراج با آب گرم می‌تواند به عنوان شاخص کیفیت ماده آلی خاک در خاک‌های جنگلی استفاده شود؛ بنابراین، اجزای ماده آلی خاک (کربن آلی و نیتروژن قابل استخراج با آب گرم، کربن آلی و نیتروژن قابل استخراج با آب سرد و زی‌توده میکروبی کربن و نیتروژن) برای توصیف کمیت و کیفیت ماده آلی خاک اندازه‌گیری شدند. اهداف این مطالعه عبارت بودند از: (الف) اندازه‌گیری و مقایسه مواد آلی قابل استخراج با آب گرم با زی‌توده میکروبی، ماده آلی قابل استخراج با آب سرد و نسبت آنها به کل کربن آلی و نیتروژن (ب) تأثیر تیپ‌های جنگلی خالص و آمیخته بر کمیت و کیفیت ماده آلی خاک. (ج) ارزیابی اینکه آیا در خاک‌های جنگلی ماده آلی قابل استخراج با آب گرم پتانسیل تبدیل به یک شاخص کیفیت خاک را دارد؟

مواد و روش‌ها

منطقه مورد بررسی

منطقه مورد مطالعه در عرض جغرافیایی "۳۵°۴۵'۴۵" تا "۳۵°۵۵'۱۵" شمالی و طول جغرافیایی "۴۵°۴۰'۵۵" تا "۴۵°۵۰'۴۵" شرقی در جنگل‌های آرمرده در جنوب غربی شهرستان بانه در استان کردستان قرار دارد. میزان بارندگی سالانه تقریباً ۷۶۰ میلی‌متر و متوسط ارتفاع از سطح دریا ۱۵۵۰ متر است. این منطقه تحت نفوذ دو توده هوایی پرفشار سرد شمال سیبری و توده هوای شرقی مدیترانه می‌باشد و دارای زمستان‌های سرد و طولانی و توام با برف و یخبندان و تابستان‌های معتدل است. نزولات جوی به صورت برف در زمستان و باران در اواخر زمستان و اوایل بهار می‌باشد. در طبقه‌بندی اقلیمی آمبرژه بانه دارای اقلیم نیمه مرطوب و سرد است. منحنی آمبروترمیک منطقه نشان‌دهنده فصل خشک چهار ماهه است. بیش از ۸۰ درصد پایه‌ها شاخه‌زاد و بقیه دانه زاد هستند. بلوط گونه‌ی درختی غالب (۹۴ درصد) در این جنگل‌ها می‌باشد (Valipour *et al.*, 2013). این جنگل‌ها دارای ساختار دو اشکوب که درختان زالزالک در اشکوب دوم قرار دارند و دارای ساختار همسال متقارن و مسن می‌باشند (Valipour *et al.*, 2014). فلور کف تقریباً یکسان و ترکیب اصلی گیاهان کف عبارت‌اند از گراس‌ها یا گندمیان یک یا چندساله مانند انواع فلومیس و پوپا و توپلاق و جو و تعدادی از گونه‌های گیاهان خاردار مانند شکر تیغال و کنگر. خاک‌های

قهوه‌ای آهکی و خاک‌های جوان از نوع واریزه‌ای لیتوسول و شیبست‌های آهکی از عمده خاک‌های این منطقه هستند (Maleki et al., 2022).

روش پژوهش

تعیین تیپ‌های جنگلی مختلف با استفاده از نظرات متخصصین جنگل‌شناسی و همچنین با استفاده از آماربرداری در منطقه مورد مطالعه صورت گرفت و دو تیپ خالص (*Quercus infectoria*) و آمیخته (*Quercus libani*-*Quercus infectoria*) انتخاب شدند. در هر یک از تیپ‌های موجود تعداد ۵ قطعه نمونه ۲۰*۳۰*۴۰ (مترمربعی) (مجموعاً ۱۰ قطعه نمونه) به صورت تصادفی پیاده و آماربرداری شد (Padalia et al., 2022). مشخصه‌های کمی شامل قطر برابر سینه و ارتفاع درخت با استفاده از نوار قطرسنج (سانتی‌متر) و شیب‌سنج سونوتو اندازه‌گیری شد. در ادامه تعداد در هکتار و مساحت تاج پوشش در هر یک از تیپ‌های مورد بررسی

محاسبه شد (جدول ۱). در هر تیپ جنگلی ۱۰ نمونه خاک به روش تصادفی پس از حذف لاشبرگ از عمق ۰-۱۰ سانتی-متری خاک برداشت گردید (این عمق از خاک در جنگل‌های بلوط بر حسب منابع مختلف (Mohammadi Samani, 2006) بعد از کنار گذاشتن لایه لاشبرگ دارای بیشترین مقدار ماده آلی می‌باشد). نمونه‌برداری با فاصله ۸۰ سانتی‌متری از تنه اصلی درختان انجام و ریشه‌های قابل مشاهده با دست حذف شدند (Busari et al., 2023). پس از انتقال نمونه خاک‌ها با کیسه‌های پلاستیکی به آزمایشگاه، نمونه خاک‌ها از الک دو میلی‌متری رد و به دو قسمت تقسیم شدند. یک قسمت از نمونه‌ها بلافاصله به دمای ۴ درجه سانتی‌گراد جهت اندازه‌گیری زی‌توده میکروبی کربن و نیتروژن منتقل شد، قسمتی از نمونه‌ها نیز در هوای آزاد جهت اندازه‌گیری کربن آلی و نیتروژن کل قرار گرفتند.

جدول ۱- میانگین \pm اشتباه معیار مشخصه‌های کمی درختان در ارتباط با تیپ‌های مورد بررسی.

Table 1. Mean \pm standard error quantitative characteristics of trees in relation to the studied types.

تعداد در هکتار Number per hectare	مساحت تاج پوشش (مترمربع) Crown canopy (m ²)	ویژگی‌های جنگل‌شناسی Features of forestry		تیپ‌ها Types
		قطر برابر سینه (سانتی‌متر) Diameter at breast height (cm)	ارتفاع کل درخت (متر) Total height tree (m)	
90	11 \pm 0.50 ^b	34 \pm 0.65 ^a	6.7 \pm 0.10 ^a	مازودار <i>infectoria</i>
8	14 \pm 0.32 ^a	25 \pm 0.55 ^b	5.4 \pm 0.08 ^b	سایر گونه‌ها Other species
140	11.5 \pm 0.61 ^b	37 \pm 0.47 ^a	6.9 \pm 0.09 ^a	ویول <i>libani</i>
90	11 \pm 0.60 ^b	35 \pm 0.36 ^b	6.68 \pm 0.11 ^a	مازودار <i>infectoria</i>
12	12.5 \pm 0.32 ^a	22 \pm 0.49 ^c	5 \pm 0.08 ^b	سایر گونه‌ها Other species

خاک بر مبنای میلی‌گرم بر کیلوگرم محاسبه شد. جهت اندازه‌گیری زی‌توده میکروبی نیتروژن، به روش تدخین-استخراج، نمونه‌های خاک پس از تدخین با کلروفورم با محلول سولفات پتاسیم عصاره‌گیری و عصاره‌ها تا موقع اندازه‌گیری در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. در نهایت مقدار نیتروژن زی‌توده میکروبی بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم اندازه‌گیری شد (Witt et al., 2000). به منظور اندازه‌گیری کربن و نیتروژن قابل استخراج با آب سرد مقدار پنج گرم خاک با ۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر به مدت یک ساعت با سرعت ۳۰ دور بر دقیقه تکان داده شد. سوسپانسیون به دست آمده به مدت ۲۰ دقیقه با سرعت ۳۵۰۰ دور در دقیقه تکان داده شد و مقدار کربن و نیتروژن موجود در عصاره با روش هضم تر اندازه‌گیری شد. برای تعیین کربن و نیتروژن قابل استخراج با آب گرم ۴۰ میلی‌لیتر آب مقطر به حدود پنج گرم خاک خشک اضافه و پس از تکان دادن به مدت ۱۰ ثانیه در حمام آب گرم با دمای ۸۰ درجه سلسیوس به مدت ۱۶ ساعت قرار گرفت. پس از سانتریفیوژ و عبور از فیلتر مقدار کربن به روش هضم تر اندازه‌گیری شد (Ghani et al., 2003).

تجزیه و تحلیل آماری

pH خاک با روش پتانسیومتری و با استفاده از دستگاه pH متر تعیین گردید (Koković et al., 2022). بافت خاک با استفاده از روش هیدرومتر تعیین شد (Sheldrick et al., 1993). کربن آلی خاک با استفاده از روش تیتراسیون والکلی-بلاک اندازه‌گیری شد (Walkley, 1947). محتوای کل نیتروژن با روش کج‌دلال ارزیابی شد (Nelson & Sommers, 1980). به منظور اندازه‌گیری زی‌توده میکروبی کربن، به روش تدخین-استخراج، ابتدا خاک مرطوب با کلروفورم به مدت ۲۴ ساعت در درون دسیکاتور تدخین شد. سپس خاک تدخین شده با محلول عصاره‌گیر سولفات پتاسیم نیم مولار به مدت ۳۰ دقیقه شیک و عصاره‌گیری شد. همین کار با خاک شاهد (تدخین نشده) هم انجام شد. مقدار ۴ میلی‌لیتر از عصاره استخراج شده برداشته و به درون لوله‌های هضم انتقال داده شد. سپس مقدار ۲ میلی‌لیتر پتاسیم دی‌کرومات و ۵ میلی‌لیتر اسید سولفوریک غلیظ به این محلول اضافه شد. پس از آن ۳ قطره از محلول شناساگر اضافه شد و در نهایت با استفاده از فرو آمونیوم سولفات، تیتراسیون نمونه‌ها صورت گرفت. با توجه به تفاوت کربن آلی استخراج شده از خاک نمونه‌ها (تدخین شده) و خاک شاهد (تدخین نشده) مقدار کربن زی‌توده میکروبی

تجزیه و تحلیل‌های آماری با نرم‌افزارهای Origin Pro و SPSS انجام شد. برای مقایسه ویژگی‌های ماده آلی خاک از آزمون t مستقل استفاده شد. همبستگی پیرسون برای ارزیابی روابط بین کربن و نیتروژن قابل استخراج با آب گرم و سایر بخش‌های ماده آلی و خواص فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج و بحث

مقادیر کربن آلی بین تیپ‌های خالص و آمیخته تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (جدول ۲). این نتیجه همسو با نتایج حق‌وردی و کوچ (Haghverdi & Kooch, 2019) بود. اگرچه وانگ و همکاران به این نتیجه رسیدند که مقدار کربن آلی در تیپ‌های خالص نسبت به آمیخته کمتر است (Silong *et al.*, 2000). این نتیجه می‌تواند به دلیل یکسان بودن شرایط خاک در عمق سطحی باشد (Foltran & Lamersdorf, 2023). برخلاف نتایج کرمر و همکاران (Cremer *et al.*, 2016) نیتروژن خاک در تیپ خالص مازودار نسبت به تیپ ویول-مازودار اختلاف معنی‌داری را نشان نداد (جدول ۲). با توجه به گزارشات مختلف در مورد نیتروژن در تیپ‌های مختلف در

جدول ۲- میانگین (\pm اشتباه معیار) ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی در تیپ‌های مازودار خالص و ویول-مازودار.

Table 2. Mean (\pm standard error) physicochemical characteristics of surface soil in Pure *infectoria* and *libani-infectoria*.

ویول-مازودار <i>libani-infectoria</i>	مازودار خالص <i>Pure infectoria</i>	
7.86 \pm 0.56 ^a	6.86 \pm 0.51 ^a	کربن آلی خاک (میلی‌گرم بر کیلوگرم) Soil organic C (mg kg ⁻¹)
4.15 \pm 0.53 ^a	5.99 \pm 0.76 ^a	نیتروژن خاک (میلی‌گرم بر کیلوگرم) Soil N (mg kg ⁻¹)
0.65 \pm 0.05 ^a	0.66 \pm 0.01 ^a	اسیدیته خاک Soil pH
27.8 \pm 3.34 ^a	34.8 \pm 1.44 ^b	شن (%) Sand (%)
43 \pm 3.04 ^b	33.4 \pm 3.42 ^a	سیلت (%) Silt (%)
29.2 \pm 3.64 ^a	31.8 \pm 2.72 ^a	رس (%) Clay (%)
لومی	لومی-رسی	بافت Texture

حروف متفاوت لاتین نشان دهنده اختلاف معنی‌داری و حروف مشابه نشان دهنده عدم اختلاف معنی‌داری است.

The different letters indicate significant difference and the same letters indicate non-significant difference.

هیچ یک از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک همبستگی معنی‌داری را نشان ندادند (جدول ۳). همچنین کربن آلی قابل استخراج با آب گرم با سیلت همبستگی منفی و نیتروژن قابل استخراج با آب گرم با رس و شن همبستگی منفی را نشان دادند (جدول ۳). مطالعه بارتیمج و همکاران (Woś *et al.*, 2022) در مقایسه ماده آلی با سایر ویژگی‌های خاک در تیپ‌های مختلف نشان داد که کربن آلی قابل استخراج با آب گرم با شن همبستگی منفی و با سیلت همبستگی مثبت دارد.

طبق جدول ۳ در تیپ مازودار خالص کربن آلی قابل استخراج با آب گرم همبستگی معنی‌داری با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک نشان نداد. کربن قابل استخراج با آب گرم با رس و شن همبستگی منفی را نشان دادند. مطابق با نتایج وانگ و همکاران نیتروژن قابل استخراج با آب گرم با کربن آلی خاک (در سطح ۹۹ درصد) و شن (در سطح ۹۵ درصد) دارای همبستگی معنی‌داری بود (Wang & Wang, 2007). در تیپ ویول-مازودار کربن آلی و نیتروژن قابل استخراج با آب گرم با

جدول ۳- همبستگی مواد آلی قابل استخراج با آب گرم با ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در تیپ‌های مازودار خالص و ویول- مازودار.
Table 3. Correlation organic matter extractable with hot water and physical and chemical characteristics of soil in pure *infectoria* and *libani- infectoria*.

ویژگی‌های خاک Soil Properties						تیپ‌ها Types
شن (%) Sand (%)	سیلت (%) Silt (%)	رس (%) Clay (%)	اسیدیته خاک Soil pH	نیترژن خاک Soil N	کربن آلی خاک Soil organic C	
-0.441	0.470	-0.361	0.110	0.377	0.479	مازودار خالص <i>Pure infectoria</i>
0.582*	-0.015	-0.111	0.088	0.199	0.720**	کربن آلی قابل استخراج با آب گرم Hot-water extractable C
0.274	-0.316	0.274	0.458	0.501	0.345	نیترژن قابل استخراج با آب گرم Hot-water extractable N
-0.001	0.394	-0.324	0.514	0.306	0.433	کربن آلی قابل استخراج با آب گرم Hot-water extractable C نیترژن قابل استخراج با آب گرم Hot-water extractable N

* و ** به ترتیب معنی‌دار در سطح $P < 0.05$ و $P < 0.01$.

زی‌توده میکروبی که حساس‌ترین بخش ماده آلی خاک است، تأثیر بالایی در عملکردهای مختلف خاک دارد (Ge et al., 2011). هر چند که نتایج پژوهش وانگ و همکاران (Wang et al., 2005) نشان داد که زی‌توده میکروبی کربن و نیترژن در خاک مزارع *C. lanceolata* به طور قابل توجهی کمتر از جنگل‌های پهن‌برگ آمیخته بود. در مطالعه حاضر، مقدار زی-توده میکروبی کربن و نیترژن در تیپ خالص مازودار در مقایسه با تیپ ویول- مازودار معنی‌دار نبود (جدول ۴). فعالیت آنزیم‌ها با pH خاک و ظرفیت تبادل کاتیونی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فعالیت زی‌توده میکروبی خاک هستند (Devi & Yadava, 2006)، که به نظر می‌رسد با توجه به دلیل یکسان بودن pH در دو تیپ مورد مطالعه مقدار زی‌توده میکروبی کربن و نیترژن در بین تیپ‌ها فاقد اختلاف معنی‌دار بوده است.

مقادیر کربن آلی و نیترژن قابل استخراج با آب گرم و نیترژن قابل استخراج با آب سرد در تیپ مازودار خالص و ویول- مازودار تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند (جدول ۴) که با مشاهدات ژو و ژو در استان ژجیانگ مطابقت داشت (Xu & Xu, 2003). همچنین غنی و همکاران (Ghani et al., 2003) گزارش کردند که مقدار کربن آلی قابل استخراج با آب گرم در بوته‌زارها بیشتر از مراتع است. در این مطالعه نسبت کربن و نیترژن قابل استخراج با آب گرم کمتر از مقدار گزارش شده توسط کوداک و همکاران (Chodak et al., 2003) در خاک‌های معدنی در عمق ۰-۲۰ سانتی‌متر در جنگل‌های راش بود. اما مقدار کربن آلی قابل استخراج با آب سرد تفاوت معنی‌داری را بین دو تیپ مورد بررسی نشان داد (جدول ۴). این نتیجه همسو با نتایج سینگ و همکاران (Singh et al., 2012) بود.

جدول ۴- نتایج مقایسه میانگین‌ها بین کربن و نیترژن قابل استخراج با آب گرم، کربن و نیترژن قابل استخراج با آب سرد و زی‌توده میکروبی کربن و نیترژن خاک سطحی (میانگین \pm اشتباه معیار) در تیپ‌های مازودار خالص و ویول- مازودار.

ویول- مازودار <i>libani- infectoria</i>	مازودار خالص <i>Pure infectoria</i>	
765.2 \pm 64.61 ^a	588.6 \pm 92.64 ^a	کربن آلی قابل استخراج با آب گرم (میلی‌گرم بر کیلوگرم) Hot-water extractable organic C (mg kg ⁻¹)
35.4 \pm 4.69 ^a	29.126 \pm 3.37 ^a	نیترژن قابل استخراج با آب گرم (میلی‌گرم بر کیلوگرم) Hot-water extractable total N (mg kg ⁻¹)
181.1 \pm 22.94 ^a	118.3 \pm 9.853 ^b	کربن آلی قابل استخراج با آب سرد (میلی‌گرم بر کیلوگرم) Cold-water extractable organic C (mg kg ⁻¹)
7.91 \pm 1.55 ^a	6.36 \pm 0.58 ^a	نیترژن قابل استخراج با آب سرد (میلی‌گرم بر کیلوگرم) Cold-water extractable total N (mg kg ⁻¹)
161.03 \pm 11.17 ^a	148.19 \pm 13.72 ^a	زی‌توده میکروبی کربن (میلی‌گرم بر کیلوگرم) Microbial biomass C (mg kg ⁻¹)
69.81 \pm 12.94 ^a	60.72 \pm 6.72 ^a	زی‌توده میکروبی نیترژن (میلی‌گرم بر کیلوگرم) Microbial biomass N (mg kg ⁻¹)

حروف متفاوت لاتین نشان دهنده اختلاف معنی‌داری و حروف مشابه نشان دهنده عدم اختلاف معنی‌داری است.
The different letters indicate significant difference and the same letters indicate non-significant difference.

قابل استخراج با آب گرم با کربن آلی قابل استخراج با آب سرد به ترتیب در تیپ‌های مازودار خالص و ویول- مازودار ۷۶ و ۸۰ درصد بود (شکل ۱ ج و د). همبستگی مربوط به نیترژن قابل استخراج با آب گرم با زی‌توده میکروبی نیترژن در تیپ مازودار خالص ۸۳ درصد (شکل ۲ الف) و در تیپ ویول- مازودار ۸۸ درصد بود (شکل ۲ ب). همچنین همبستگی مربوط به نیترژن قابل استخراج با آب گرم با نیترژن قابل استخراج با آب سرد در تیپ‌های مازودار خالص و ویول- مازودار به ترتیب ۸۵ و ۹۲

نتایج آزمون معنی‌داری بین کربن و نیترژن قابل استخراج با آب گرم، کربن آلی و نیترژن با زی‌توده میکروبی کربن و نیترژن، کربن قابل استخراج با آب سرد و نیترژن قابل استخراج با آب سرد همبستگی معنی‌داری (در سطح ۹۹ درصد) را نشان دادند (جدول ۵). همبستگی کربن آلی قابل استخراج با آب گرم با زی‌توده میکروبی کربن در تیپ مازودار خالص ۸۲ درصد (شکل ۱ الف) و در تیپ ویول- مازودار ۸۶ درصد بود (شکل ۱ ب). همچنین همبستگی بین کربن آلی

درصد بود (شکل ۲ ج و د). این نتایج هم راستا با نتایج وانگ و وانگ (۲۰۰۷) بود و در مجموع ماهیت کلی ماده آلی را نشان می‌دهد.

جدول ۵- نتایج آزمون معنی‌داری بین ویژگی‌های ماده آلی خاک.





Table 5. The results of the significance test between the characteristics of soil organic matter.

نیترژن قابل استخراج با آب سرد Cold-water extractable N		زیئوده میکروبی نیترژن Microbial biomass N		کربن آلی قابل استخراج با آب سرد Cold-water extractable C		زیئوده میکروبی کربن Microbial biomass C	
ویول-مازودار Infectoria-Libani	مازودار خالص Pure Infectoria	ویول-مازودار Infectoria-Libani	مازودار خالص Pure Infectoria	ویول-مازودار Infectoria-Libani	مازودار خالص Pure Infectoria	ویول-مازودار Infectoria-Libani	مازودار خالص Pure Infectoria
				0.000**	0.001**	0.000**	0.001**
0.000**	0.000**	0.000**	0.000**	0.007**	0.000**	0.003**	0.006**
0.001**	0.003**	0.000**	0.001**				

کربن آلی قابل استخراج با آب گرم
Hot-water extractable C
نیترژن قابل استخراج با آب گرم
Hot-water extractable N
کربن آلی خاک
Soil organic C
نیترژن خاک
Total N


** معنی‌دار در سطح ۰.۰۱

** Significant at the 0.01 level.



شکل ۱- (الف) همبستگی کربن آلی قابل استخراج با آب گرم (C hwo) با زیئوده میکروبی کربن (C mic) در تیپ مازودار خالص و (ب) تیپ ویول-مازودار- (ج) رابطه کربن آلی قابل استخراج با آب گرم (C hwo) با کربن آلی قابل استخراج با آب سرد (C cwo) در تیپ مازودار خالص و (د) تیپ ویول-مازودار.

Figure 1. (a) The correlation between hot water extractable carbon (C hwo) and the microbial biomass carbon (C mic) in pure *infectoria* type and (b) *libani- infectoria* types - (c) the correlation of hot water extractable carbon (C hwo) with cold water extractable carbon (C cwo) in pure *infectoria* type and (d) *libani- infectoria* types.







شکل ۲- (الف) همبستگی نیتروژن قابل استخراج با آب گرم (N hwo) با زی توده میکروبی نیتروژن (N mic) در تیپ مازودار خالص و (ب) تیپ ویول- مازودار- (ج) همبستگی نیتروژن قابل استخراج با آب گرم (N hwo) با نیتروژن قابل استخراج با آب سرد (N cwo) در تیپ مازودار خالص و (د) تیپ ویول - مازودار.





Figure 1. (a) The correlation between hot water extractable nitrogen (N hwo) and the microbial biomass nitrogen (N mic) in pure *infectoria* type and (b) *libani- infectoria* types - (c) the correlation of hot water extractable nitrogen (N hwo) with cold water extractable nitrogen (N cwo) in pure *infectoria* type and (d) *libani- infectoria* types.

نتایج مربوط به نیتروژن خاک با زی توده میکروبی نیتروژن مقادیر ۷۷ و ۸۰ درصد را به ترتیب در تیپ های مازودار خالص و ویول- مازودار نشان داد (شکل ۴ الف و ب). نتایج همبستگی نیتروژن خاک با نیتروژن قابل استخراج با آب سرد نیز برای تیپ مازودار خالص مقادیر ۶۹ درصد و برای تیپ ویول- مازودار ۷۷ درصد را نشان دادند (شکل ۴ ج و د).

نتایج همبستگی بین کربن آلی خاک با زی توده میکروبی کربن در تیپ مازودار خالص (شکل ۳ الف) و در تیپ ویول- مازودار ۸۱ درصد را نشان داد (شکل ۳ ب). همچنین مقدار همبستگی کربن آلی با کربن قابل استخراج با آب سرد نیز در تیپ ویول- مازودار با مقدار ۸۱ درصد (شکل ۳ ج) بیشتر از تیپ مازودار خالص (۷۷ درصد) بود (شکل ۳ د). در نهایت



شکل ۳- (الف) همبستگی کربن آلی خاک (C) با زی توده میکروبی کربن (C mic) در تیپ مازودار خالص و (ب) تیپ مازودار- ویول- (ج) همبستگی کربن آلی خاک (C hwo) با کربن آلی محلول در آب سرد (C cwo) در تیپ مازودار خالص و (د) تیپ مازودار- ویول- Figure 3. (a) The correlation between soil organic carbon (C) and microbial biomass carbon (C mic) in the pure *infectoria* types and (b) *libani- infectoria* types- (c) The correlation between soil organic carbon (C hwo) and cold water extractable carbon (C cwo) the pure *infectoria* types and (d) *libani- infectoria* types.



شکل ۳- (الف) همبستگی نیتروژن خاک (N) با زی توده میکروبی نیتروژن (N mic) در تیپ مازودار خالص و (ب) تیپ ویول- مازودار- (ج) رابطه نیتروژن خاک (N hwo) با نیتروژن قابل استخراج با آب سرد (N cwo) در تیپ مازودار خالص و (د) تیپ ویول- مازودار.
 Figure 3. (a) The correlation between soil nitrogen (N) and microbial biomass nitrogen (N mic) in the pure *infectoria* types and (b) *libani- infectoria* types - (c) The correlation between soil nitrogen (N hwo) and cold water extractable nitrogen (N cwo) the pure *infectoria* types and (b) *libani- infectoria* types.

قابل استخراج با آب گرم کربن‌های تجزیه‌پذیر و سایر مواد مغذی حساس نیز استخراج می‌شوند (Ghani *et al.*, 2003). در مطالعه حاضر، مواد آلی قابل استخراج با آب گرم با کربن آلی و نیتروژن خاک در هر دو نوع تیپ جنگلی همبستگی مثبت داشتند. برخی مطالعات نیز این همبستگی را گزارش کرده‌اند (Bankó *et al.*, 2021). برخی از محققین پیشنهاد کرده‌اند که کربن آلی در حال معدنی شدن با اندوخته‌های قابل دسترس نیتروژن آلی را می‌توان به راحتی با روش استخراج آب گرم تعیین کرد (Bankó *et al.*, 2021)؛ بنابراین، کاهش کربن آلی قابل استخراج با آب گرم یا نیتروژن کل می‌تواند نشانه اولیه کاهش کربن آلی و نیتروژن کل خاک باشد که نتایج غنی و همکاران این موضوع را تأیید می‌کند (Ghani *et al.*, 2003). زی توده میکروبی کربن و نیتروژن و مواد آلی قابل استخراج با آب سرد ارتباط نزدیکی با کربن آلی یا نیتروژن کل خاک داشتند (شکل ۳ و ۴)، اما ضرایب همبستگی آنها کمتر از همبستگی مواد آلی قابل استخراج با آب گرم، کربن یا نیتروژن خاک بود که با نتایج وانگ و همکاران (Wang *et al.*, 2005) مطابقت داشت. این نتیجه برخلاف مشاهدات چوداک و همکاران (Chodak *et al.*, 2003) بود.

گونه‌های درختی بوم‌سازگان‌های جنگلی با تأثیر از طریق ویژگی‌های متفاوتشان در تولید لاشبرگ و به تبع آن بازگرداندن عناصر غذایی و ترکیبات شیمیایی از مهمترین عوامل مؤثر بر تغییر ویژگی‌های خاک می‌باشند. در مطالعه حاضر میزان نیتروژن کل و کربن آلی خاک دو تیپ مورد بررسی تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند. هر چند که مقادیر کربن آلی و نیتروژن قابل استخراج با آب سرد، زی توده میکروبی کربن و نیتروژن در تیپ ویول- مازودار بیشتر بود؛ اما این تفاوت به غیر از کربن آلی قابل استخراج با آب سرد معنی‌دار نشد. بین کربن آلی قابل استخراج با آب گرم با زی توده میکروبی کربن و کربن قابل استخراج با آب سرد همبستگی معنی‌داری وجود داشت. همچنین بین نیتروژن قابل استخراج با آب گرم با زی توده میکروبی کربن و کربن همبستگی معنی‌دار مشاهده شد. در نهایت همبستگی معنی‌داری بین نیتروژن خاک با زی توده میکروبی و نیتروژن قابل استخراج با آب سرد وجود داشت، اما ضریب همبستگی کمتر از همبستگی کربن آلی خاک با زی توده میکروبی کربن و کربن قابل استخراج با آب سرد بود؛ بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مواد آلی قابل استخراج با آب گرم را می‌توان به عنوان یک شاخص حساس از تغییرات کیفیت ماده آلی در خاک‌های جنگلی استفاده کرد.

در بین درختان و خاک تأثیر متقابل وجود دارد. همان‌طور که رشد و تولید درختان به خصوصیات خاک ارتباط دارد، از طرف دیگر درختان با لاشبرگ و ویژگی‌های منحصر به فرد خود بر خاک زیر اشکوب تأثیر می‌گذارند، در مطالعات مختلف داخلی به اهمیت آمیختگی گونه‌ها بر خاک اشاره شده است (Bayranvand *et al.*, 2022; Jafarisarabi *et al.*, 2020). اولیایی و همکاران (۲۰۱۱) گزارش دادند که درختان بلوط در منطقه یاسوج موجب افزایش معنی‌دار کربن آلی و نیتروژن می‌شوند. محمدی سمانی و همکاران (۱۳۸۵) در تحقیقی مقدار رابطه برخی از خصوصیات شیمیایی خاک با چند تیپ درختی را در جنگل‌های مریوان بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بین تیپ‌های مختلف مقدار کربن و ازت اختلاف معنی‌داری بین تیپ‌ها دارد. در این تحقیق نوع گونه، هوموس و سطح تاج پوشش از مهمترین دلایل بین تیپ‌ها ذکر شده است (Mohammadi Samani, 2006). در بررسی شاخص کیفیت خاک در جنگل‌های آرمده بانه ملکی و همکاران (۲۰۲۳) نتایج متغیری بین تیپ‌های مختلف گزارش کردند (Maleki *et al.*, 2023). در رابطه با قسمت‌های مختلف ماده آلی اسپارلینگ و همکاران (Sparling *et al.*, 1998) گزارش کردند که محتوای کربن آلی قابل استخراج با آب گرم خاک‌های معدنی تقریباً ۴۳ درصد از زی توده میکروبی کربن است. همچنین در تحقیقی چن و ژو (Chen & Xu, 2005) تأیید کردند که کربن آلی قابل استخراج با آب گرم و نیتروژن کل تا حدودی از میکروارگانسیم‌های خاک مشتق شده‌اند. نسبت درصد زی توده میکروبی کربن به کربن آلی خاک و زی توده میکروبی نیتروژن به نیتروژن خاک منعکس‌کننده در دسترس بودن ماده آلی به میکروارگانسیم‌های خاک و بخشی از مواد مقاوم در خاک است و این نسبت‌ها با کاهش غلظت مواد آلی موجود به شدت کاهش می‌یابد (Anderson & Domsch, 1986). مواد آلی قابل استخراج با آب سرد در خاک که از لحاظ مواد مولکولی مانند اسیدهای آلی و اسیدهای آمینه نسبتاً فقیر هستند، نقش مهمی در بیوژئوشیمی عناصر غذایی ایفا می‌کنند. کربن آلی قابل استخراج با آب سرد بین تیپ خالص مازودار و ویول- مازودار تفاوت معنی‌داری را نشان داد. نتایج پژوهش جیانگ (Peikun, 2005) نشان داد که کربن آلی قابل استخراج با آب سرد در مزارع خالص *C. lanceolata* به طور قابل توجهی کمتر از جنگل‌های پهن برگ همیشه‌سبز است. با این حال، ژو و ژو (Xu & Xu, 2003) مشاهده کردند که تفاوت معنی‌داری در کربن آلی قابل استخراج با آب سرد بین توده‌های *C. lanceolata* و جنگل‌های پهن برگ همیشه‌سبز وجود ندارد. در فرایند مواد آلی

- Anderson, T., & Domsch, K. (1986). Carbon link between microbial biomass and soil organic matter. *Perspectives in microbial ecology*, 467-471 .
- Badehian, Z., Mansouri, M. and Soleymani, N. (2021). Quantitative analysis of oak stands in relation to the physiographic traits in le Goran, Kermanshah Province. *Journal of Environmental Science and Technology*, 23(3), pp.1-12. [https://doi.org/10.30495/JEST.2018.25775.3470].
- Baiz Sharif, H., Khaleghpanah, N., Davari, M., Rahimzadeh, M., (2023). Investigating the performance of check dams in granularity of sedimentation in a watershed affected by debris flow (Nanor, Baneh). *Journal of Water and Soil Conservation*, 30 (1), 111-130. [https://doi.org/10.22069/JWSC.2023.21077.3621]
- Bankó, L., Tóth, G., Marton, C. L., & Hoffmann, S. (2021). Hot-water extractable C and N as indicators for 4p100 goals in a temperate-climate long-term field experiment: A case study from Hungary. *Ecological Indicators*, 126, 107364 .[https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107364]
- Bayranvand, M. B., Akbarinia, M., Salehi Jouzani, G., Gharechahi, J., & Kooch, Y. (2021). Humus index assessment in relation to forest cover variables and altitude gradient. *Ecology of Iranian Forest*, 9(18), 169-178 .[10.52547/ifej.9.18.169]
- Bronner, H., & Bachler, W. (1979). hydrolysierbare Stickstoff als Hilfsmittel für die Schätzung des Stickstoffnachlieferungsvermögens von Zuckerrubensboden. *Landwirtschaftliche Forschung* .
- Busari, M.A., Bankole, G.O., Adiamo, I.A., Abiodun, R.O. and Ologunde, O.H., (2023). Influence of mulch and poultry manure application on soil temperature, evapotranspiration and water use efficiency of dry season cultivated okra. *International Soil and Water Conservation Research*, 11(2), pp.382-392. [https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2022.09.003]
- Chen, C., & Xu, Z. (2005). Soil carbon and nitrogen pools and microbial properties in a 6-year-old slash pine plantation of subtropical Australia: impacts of harvest residue management. *Forest Ecology and Management*, 206(1-3), 237-247 .[https://doi.org/10.1016/j.foreco.2004.11.005]
- Chodak, M., Khanna, P., & Beese, F. (2003). Hot water extractable C and N in relation to microbiological properties of soils under beech forests. *Biology and fertility of soils*, 39, 123-130. [https://doi.org/10.1007/s00374-003-0688-0]
- Corre, M., Schnabel, R., & Shaffer, J. A. (1999). Evaluation of soil organic carbon under forests, cool-season and warm-season grasses in the northeastern US. *Soil Biology and Biochemistry*, 31(11), 1531-1539 .
- Cremer, M., Kern, N. V., & Prietzel, J. (2016). Soil organic carbon and nitrogen stocks under pure and mixed stands of European beech, Douglas fir and Norway spruce. *Forest Ecology and Management*, 367, 30-40 .[https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.02.020]
- Devi, N. B., & Yadava, P. (2006). Seasonal dynamics in soil microbial biomass C, N and P in a mixed-oak forest ecosystem of Manipur, North-east India. *Applied Soil Ecology*, 31(3), 220-227 . [https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2005.05.005]
- Edwards, C. A., & Arancon, N. Q. (2022). The Role of Earthworms in Organic matter and nutrient cycles. In *Biology and ecology of earthworms* (pp. 233-274). Springer .
- Foltran, E. C., & Lamersdorf, N. (2023). Tree Species Identity Drives Soil Carbon and Nitrogen Stocks in Nutrient-Poor Sites. *bioRxiv*, 2023.2005.2015.540797 .[https://doi.org/10.1101/2023.05.15.540797]
- Gagnon, B., & Ziadi, N. (2022). Soil carbohydrate and aggregation as affected by carbohydrate composition of paper mill biosolids. *Canadian Journal of Soil Science*, 102(2), 371-384 . [https://doi.org/10.1139/CJSS-2021-0136]
- Ge, T., Nie, S. a., Wu, J., Shen, J., Xiao, H. a., Tong, C., Huang, D., Hong, Y., & Iwasaki, K. (2011). Chemical properties, microbial biomass, and activity differ between soils of organic and conventional horticultural systems under greenhouse and open field management: a case study. *Journal of Soils and Sediments*, 11, 25-36 .[10.1007/S11368-010-0293-4]
- Ghani, A., Dexter, M., & Perrott, K. (2003). Hot-water extractable carbon in soils: a sensitive measurement for determining impacts of fertilisation, grazing and cultivation. *Soil Biology and Biochemistry*, 35(9), 1231-1243 .[https://doi.org/10.1016/S0038-0717(03)00186-X]
- Guo, X., Meng, M., Zhang, J., & Chen, H. Y. (2016). Vegetation change impacts on soil organic carbon chemical composition in subtropical forests. *Scientific reports*, 6(1), 2 . ۹۶۷
- Haghverdi, K., & Kooch, Y. (2019). Effects of diversity of tree species on nutrient cycling and soil-related processes. *Catena*, 178, 335-344 .[https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.03.041]
- Jafari, S.H., Pilehvar, B., Abrari, V.K. and Waez, M.S.M., (2021). Changes in carbon sequestration and some edaphic traits in forest types of central Zagros (Case study: The forests of Lorestan province). 9(17), 142-151. [https://doi.org/ 10.52547/ifej.9.17.142]
- Jiang, P., Zheng, X., He, S., Xiao, L., & Liu, M. (2023). Distribution Characteristics of Labile Soil Organic Carbon in Longmenshan Seismic Fault Zone, Sichuan Province. *Eurasian Soil Science*, 1-10. [https://doi.org/10.1134/S1064229323600045]
- Joshi, R. K., & Garkoti, S. C. (2021). Influence of Nepalese alder on soil physico-chemical properties and fine root dynamics in white oak forests in the central Himalaya, India. *Catena*, 200, 105140. [https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.105140]
- Koković, N., Jačimović, G., Sikirić, B., Čirić, V., Ugrešević, V., Zhapparova, A., & Saljnikov, E. (2022). Changes in Eutric Cambisol due to long-term mineral fertilisation: A case study in Serbia. *Italian Journal of Agronomy*, 17(2) .

- Kooch, Y., Tarighat, F. S., & Haghverdi, K. (2022). Effect of Forest and Non-Forest Land Covers on Soil Organic Matter, Fulvic and Humic Acids. *Ecology of Iranian Forest*, 39-46 .
- Landgraf, D., Leinweber, P., & Makeschin, F. (2006). Cold and hot water-extractable organic matter as indicators of litter decomposition in forest soils. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*, 169(1), 76-82 .[https://doi.org/10.1002/jpln.200521711]
- Maleki, S., Pilehvar, B., & Mahmoodi, M. A. (2022). Daily and seasonal changes of soil respiration under the influence of temperature and moisture factors in different types of oak. *Journal of Wood and Forest Science and Technology*, 29(4), 59-73 .[10.22069/JWFST.2023.20825.1993]
- Maleki, S., Pilehvar, B. and Mahmoodi, M.A., (2023). Assessment of soil quality in different types of forests in North Zagros (Case study: Armardeh Baneh Forests). *Journal of Natural Environment*. [https://doi.org/10.22059/JNE.2023.356996.2540].
- Maleki, S., Pilehvar, B., & Mahmoodi, M. A. (2023). Assessing the vegetation diversity of different oak types in relation with soil characteristics in the forests of north Zagros (Case study: Armardeh Baneh). *Journal of Natural Environment* .[https://doi.org/10.22059/JNE.2023.356996.2540]
- Mohammadi Samani, K., Jalilvand, H., Salehi, A., Shahabi, M. and Goleij, A., (2006). Relationship between some soil chemical characteristics and few tree types of Zagros forests: case study of Marivan. *Iranian Journal of Forest and Poplar Research*, 14(2), pp.158-148.
- Montagnini, F. (2000). Accumulation in above-ground biomass and soil storage of mineral nutrients in pure and mixed plantations in a humid tropical lowland. *Forest Ecology and Management*, 134(1-3), 257-270 .[https://doi.org/10.1016/S0378-1127(99)00262-5]
- Nelson, D. W., & Sommers, L. E. (1980). Total nitrogen analysis of soil and plant tissues. *Journal of the Association of Official Analytical Chemists*, 63(4), 770-778.
- Padalia, K., Bargali, S. S., Bargali, K., & Manral, V. (2022). Soil microbial biomass phosphorus under different land use systems of Central Himalaya. *Tropical Ecology*, 1-19 . [https://doi.org/10.1007/s42965-021-00184-z]
- Peikun, J. (2005). Soil active carbon pool under different types of vegetation. *Scientia Silvae Sinicae* .
- Plaza-Álvarez, P., Lucas-Borja, M., Sagra, J., Zema, D., González-Romero, J., Moya, D., & De las Heras, J. (2019). Changes in soil hydraulic conductivity after prescribed fires in Mediterranean pine forests. *Journal of environmental management*, 232, 1021-1027 . [https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.12.012]
- Sheldrick, B., Wang, C., & Carter, M. (1993). Soil sampling and methods of analysis. *Particle Size Distribution. Canadian Society of Soil Science, Lewis Publishers, Boca Raton, Florida, USA*. pp. 499-511 .
- Silong, W., Liping, L., Xiaojun, Y., & Hong, G. (2000). Changes of nutritional nitrogen and phosphorus during ecological restoration of degraded Chinese fir plantation soil. *Chin J Appl Ecol*, 11, 185-190 .
- Singh, K., Singh, B., & Singh, R. (2012). Changes in physico-chemical, microbial and enzymatic activities during restoration of degraded sodic land: Ecological suitability of mixed forest over monoculture plantation. *Catena*, 96, 57-67 .[https://doi.org/10.1016/j.catena.2012.04.007]
- Sparling, G., Vojvodić-Vuković, M., & Schipper, L. (1998). Hot-water-soluble C as a simple measure of labile soil organic matter: the relationship with microbial biomass C. *Soil Biology and Biochemistry*, 30(10-11), 1469-1472 .
- Valipour, A., Plieninger, T., Shakeri, Z., Ghazanfari, H., Namiranian, M. and Lexer, M.J., (2014). Traditional silvopastoral management and its effects on forest stand structure in northern Zagros, Iran. *Forest ecology and management*, 327, pp.221-230. [https://doi.org/10.1016/j.foreco.2014.05.004]
- Valipour, A., Namiranian, M., Ghazanfari, H., Heshmatol Vaezin, S.M., Lexer, M.J. and Plieninger, T., (2013). Relationships between forest structure and tree's dimensions with physiographical factors in Armardeh forests (Northern Zagros). *Iranian journal of Forest and Poplar research*, 21(1), pp.30-47. [https://doi.org/10.22092/IJFPR.2013.3336]
- Walkley, A. (1947). A critical examination of a rapid method for determining organic carbon in soils—effect of variations in digestion conditions and of inorganic soil constituents. *Soil Science*, 63(4), 251-264 .
- Wang, Q., & Wang, S. (2007). Soil organic matter under different forest types in Southern China. *Geoderma*, 142(3-4), 349-356 .[https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2007.09.006]
- Wang, Q., Wang, S., Gao, H., & Yu, X. (2005). Dynamics of soil active organic matter in Chinese fir plantations. *Ying Yong Sheng tai xue bao= The Journal of Applied Ecology*, 16(7), 1270-1274 .
- Witt, C., Gaunt, J. L., Galicia, C. C., Ottow, J. C., & Neue, H.-U. (2000). A rapid chloroform-fumigation extraction method for measuring soil microbial biomass carbon and nitrogen in flooded rice soils. *Biology and fertility of soils*, 30, 510-519 .
- Woś, B., Pająk, M., & Pietrzykowski, M. (2022). Soil organic carbon pools and associated soil chemical properties under two pine species (*Pinus sylvestris* L. and *Pinus nigra* Arn.) introduced on reclaimed sandy soils. *Forests*, 13(2), 328 .[https://doi.org/10.3390/f13020328]
- Xu, Q., & Xu, J. (2003). Changes in soil carbon pools induced by substitution of plantation for native forest. *Pedosphere*, 13(3), 271-278 .
- Yang, R.-M., Huang, L.-M., Zhang, X., Zhu, C.-M., & Xu, L. (2023). Mapping the distribution, trends, and drivers of soil organic carbon in China from 1982 to 2019. *Geoderma*, 429, 116232 . [https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116232]

“Research Paper”

Comparison of soil organic matter in pure and mixed types of oak in North Zagros (case study: Armardeh Baneh forests)

Saman Maleki¹, Babak Pilehvar², Mohammad Ali Mahmoodi^{3*}

1 and 2* - Forestry Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad, Iran

3 - Department of Soil Science, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran
(Corresponding author: a.mahmoodi@uok.ac.ir)

Extended Abstract

Introduction and Objective: The spatial patterns of trees, as the main components of the forest ecosystem depend on their internal characteristics, interspecific relationships, and external environmental and habitat characteristics. The tree species that make up the forest types are one of the most important factors influencing soil characteristics through the production of litterfall, and they play an essential role in the quantity and quality of soil organic matter and the release of soil nutrients.

Material and Methods: The present study investigates soil organic carbon and nitrogen with hot and cold water extraction methods as an indicator of soil material changes in two pure (*Quercus infectoria*) and mixed (*Quercus libani- Quercus infectoria*) types of North Zagros (Armardeh Baneh forests). The present study measured forestry characteristics with 5 random 400 square-meter sample plots in each type. Also, the topsoil of the studied types was collected using 10 mixed samples from a depth of 0-10 cm (after removing the litterfall layer). After measuring the studied variables, the statistical comparison of the average variables in forest types was evaluated using independent samples t-test analysis of variance and their correlation with Pearson's correlation coefficient.

Results: The results showed that the amount of soil organic carbon and total nitrogen in the pure *Quercus infectoria* and *Quercus libani- Quercus infectoria* types did not show any significant difference. Although the amounts of hot and cold water extractable carbon and nitrogen, the microbial carbon and nitrogen biomass were higher in (*Quercus libani- Quercus infectoria*) types; but this difference was not significant except for hot- water extractable carbon. There was a significant correlation between hot-water extractable carbon, microbial biomass of carbon and cold-water extractable carbon. Also, a significant correlation was observed between hot- water extractable nitrogen and microbial nitrogen and carbon. Finally, there was a significant correlation between soil nitrogen with microbial biomass carbon and cold- water extractable nitrogen, but the correlation coefficient was lower than the correlation of soil organic carbon with microbial biomass carbon and cold-water extractable carbon.

Conclusion: Based on the outcome of their studies, can be concluded that organic matter that can be extracted with hot-water extractable can be used as a sensitive indicator of changes in the quality of organic matter in forest soils.

Keywords: Hot water extractable organic carbon, Microbial biomass, Pearson correlation, Soil characteristics